

COMPOSICIÓN

Ácido giberélico (GA3) 1,6% (p/v)
Líquido soluble (SL)

DOSIS Y APLICACIÓN

Clementino: Para mejorar la consistencia de la piel (tratar cuando el color verde haya desaparecido). **30-50 cc/hl**

Limonero y clementino sin hueso: Para inducir el cuajado y la fijación del fruto. Tratar a la caída del pétalo y repetir el tratamiento a las 3-4 semanas. **40 cc/hl**

Mandarino: Para evitar la caída de los frutos (tratar a la caída de pétalos, repitiendo a las 3-4 semanas) y mejorar la consistencia de la piel (tratar cuando el color verde haya desaparecido). **40 cc/hl**

Peral (Cv. Blanquilla): Para reducir la caída del fruto durante el cuajado y evitar daños producidos por heladas. Tratar con el 30-60% de flor abierta o a las 48 horas para evitar el efecto de la helada. **60-70 cc/hl**

Vid (Cv. Macabeo): Para inducir el alargamiento del racimo y de los pedúnculos del fruto. Aplicar antes de la caída de los capuchones florales. **30-50 cc/hl**

Fresal: Para favorecer el cuajado y el crecimiento del fruto. Tratar un poco antes del inicio de floración. Se puede reducir la dosis en plantaciones de más de un año. **60 cc/hl**

Alcachofa: Para inducir el crecimiento y precocidad de la cosecha. Tratar al inicio de la fructificación. **40-50 cc/hl**

PLAZO DE SEGURIDAD: Tratar a alto volumen de agua (600-1500 l/Ha). Adicionar mojanete

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Vigilar que el viento no arrastre la pulverización a otros cultivos vecinos. Aplicar el producto poco después de mezclarlo con agua para evitar su descomposición.

En caso de producirse una precipitación a las 8 horas siguientes al tratamiento, éste perderá parte de su eficacia, siendo aconsejable repetir el tratamiento.

PLAZO DE SEGURIDAD: 15 días.

REGULADOR DEL CRECIMIENTO

INCOMPATIBILIDADES

AF Giberellic SL no es compatible con soluciones que contengan cloruro libre. Siempre que el pH de la solución no exceda de 7, el producto es compatible con la mayoría de productos insecticidas, fungicidas y ciertos abonos.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

NEW

BIOSTIMULANT PLANT GROWTH REGULATOR

AF Gibberellic SL



IMPORTED FROM UE



COMPOSITION

Gibberellic acid (GA3) 1,6% (w/v)
Soluble liquid (SL)

Aspe
Factory

DOSAGE AND APPLICATION

Clementine: To improve the consistency of the peel (when the green treat is gone). **30-50 cc/hl**

Lemon and Clementine boneless: To induce fruit set and fruit setting. Treat at petal drop and repeat the treatment at 3-4 weeks. **40 cc/hl**

Tangerine: To prevent fruit drop (treat at petal drop, repeating at 3-4 weeks) and improve the consistency of the peel (when the green treat is gone). **40 cc/hl**

Pear (cv. Blanquilla): To reduce fruit drop during filling and prevent frost damage. Treat with 30-60% open flower or 48 hours to avoid the effect of frost. **60-70 cc/hl**

Vine (cv. Macabeo): To induce the elongation of the cluster and peduncles of the fruit. Apply before falling flowerhoods. **30-50 cc/hl**

Strawberry: To promote fruit set and fruit growth. Treat a little before the start of flowering. Can be reduced the dose in plantations over a year. **60 cc/hl**

Artichoke: To induce growth and harvest earliness. Treat to start fruiting. **40-50 cc/hl**

USAGE INSTRUCTIONS: Treat with high water volume (600-1500 l / ha). Add wetting

PRECAUTIONS FOR USE

Ensure that the wind does not drag the spraying to other neighboring crops. Apply the product shortly after mixing with water to prevent decomposition.

In the event of a precipitation at 8 hours after treatment, it will lose some of its effectiveness, it is advisable to repeat the treatment.

SAFETY TERM: 15 days.

GROWTH REGULATOR

INCOMPATIBILITIES

AF Giberellic SL is not compatible with free chloride solutions. Whenever the pH of the solution does not exceed 7, the product is compatible with most insecticides, fungicides and certain fertilizers.



ASPE AGROBIOLÓGICO SL
L'ametler 36, 03110
Mutxamel
Alicante SPAIN
Tel: 0034 690 816 207
export@aspeagro.com
www.aspeagro.com

DISTRIBUTEUR:
Sté Equipement Agricole
Tunisie "S. E. A. T"
Tel 71240156 - Fax 71253983
et
SELECT AGRI
Tel 71770733- Fax 71772648