

### COMPOSITION

Matière organique 25,5 % en p/p  
Potassium K2O 4,0 % en p/p  
Extrait Laminaria 45 g/l  
pH 4.2

### PROPRIÉTÉS

**LamiProtect SL** est une solution très concentrée de Laminaria, extrait de l'espèce d'algues récoltée dans l'Océan Atlantique.

Ce produit est fabriqué dans des conditions propres à préserver la structure polymère naturel des composants organiques.

**LamiProtect SL** stimule les défenses des cultures. Il renforce leur résistance contre les pathogènes, repoussant ainsi leur seuil de nuisibilité.

### USAGES

**Oïdium du fraisier,  
Feu bactérien du pommier et du poirier,  
Tavelure du pommier.**

### DOSE ET APPLICATION

#### PRÉCONISATIONS SUR L'OÏDIUM DU FRAISIER

DOSE	PÉRIODE D'APPLICATION	DAR(*)
0,70 L/Ha	Tous les 10 jours, à partir du départ de la végétation	AUCUN

**LamiProtect SL** s'utilise en traitement préventif dans un programme de protection contre l'oïdium.

Uvrez la stratégie fongicide recommandée par les Avertissement Agricoles, dès l'apparition des premiers symptômes d'oïdium.

Avant d'utiliser le produit, lire l'étiquette. Utilisez limité aux agriculteurs et aux professionnels. Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, suivez les instructions.

**NON TOXIQUE**

**NEW**  
Imported from Spain



## STIMULATEUR NATUREL DES DEFENSES CULTURES SPÉCIALISÉES EXTRAIT DU LAMINARIA

# LAMIPROTECT



### DOSE ET APPLICATION

#### PRÉCONISATIONS SUR LE FEU BACTÉRIEN DU POMMIER ET POIRIER

DOSE	PÉRIODE D'APPLICATION	DAR(*)
0,75 L/Ha 0,075 L/Hi	1ère application au stade boutons verts (D3). Positionner la dernière application au stade chute des derniers pétales (H). Poursuivre les applications en cas de contaminations ultérieures à la floraison.	AUCUN

Nombre maximum d'applications:7

#### PRÉCONISATIONS SUR LE TAVELURE DU POMMIER

DOSE	PÉRIODE D'APPLICATION	DAR(*)
1 L/Ha 0,1 L/Hi	Tous les 10 jours, du début de la période des contaminations secondaires	AUCUN

**LamiProtect SL** s'utilise contre la tavelure du pommier pendant la période des contaminations secondaires. Il s'applique durant les périodes de risques moyens.

En période de risques forts de contamination; pluies successives pendant au moins 18 heures ou supérieures à 25mm, appliquer un fongicide spécifique contre la tavelure.

DAR: Délai minimal entre le dernier traitement et la récolte.

### COMPATIBILITÉ

**LamiProtect SL** est compatible avec la plupart des fongicides et insecticides usuels.

BY ASPEFACTORY TO AGRÍCOLA DE ASPE

DISTRIBUÉ PAR:



Lamettler 36, 03110  
Muxamel  
Alicante SPAIN  
Tel: 0034 690 816 207  
export@aspegro.com  
www.aspegro.com

Sté Equipement Agricole Tunisie "SEAT"  
71 Rue Alain Savary Apt C32 Bloc C  
Tel: 71 240 156 - Fax: 71 254 478  
www.seat-agri.com

